

Skutch, Alexander F. Primer Congreso de Ornitología de Costa Rica. *Resúmenes*. San José Costa Rica, 20-22 de mayo, 1993. San José: CIPA - MNCR - PRMVS - UNA, 1993. p. 1.

Según los pocos informes que tenemos, el Guaco (*Herpetotheres cachinnans*) usualmente anida dentro un hueco en un árbol, donde pone un sólo huevo. En 1991 y 1992, una pareja anidó tres veces en palmas de aceite africana en nuestro jardín en El General. Los nidos estaban tan altos, y tan metidos entre las bases de las grandes frondas, que no pudimos alcanzarlos, ni ver la hembra cuando estaba adentro. Sin embargo, hicimos observaciones interesantes del comportamiento de los Guacos padres y sus relaciones con los animales que frecuentaban las palmas para comer frutas. En los dos años vimos los padres, principalmente al macho, traer 58 culebras, 1 lagartija, y 1 rana. Las culebras eran 30 a 90 cm de largo y casi siempre delgadas. Reconocí solamente la bejucilla, *Oxybelis aeneus*; no vi una culebra arbórea verde ni una terciopelo u otra especie de Bothrops que pudiera identificar. Pareció que las presas fueron cogidas del monte bajo o de la tierra. Después de el macho entregaba una culebra a la hembra, los dos juntaban sus voces en un dueto que duraba de 2-3 a 10 minutos, el macho gritando en voz alta "gua-co", "gua-co", mientras, su compañera contestaba "ca-o", "ca-o", "ca-o". Al terminarse el dueto, la hembra comía la culebra, a veces tragándola entera como un spaghetti, cuando tenía un pichón, llevándola al nido. Los Zopilotes Negros (*Coragyps atratus*), los Monos Cariblancos (*Cebus capucinus*) y las ardillas (*Sciurus granatensis*) que comían las frutas de la palma no molestaban al nido. Rara vez un Guaco ahuyentó un zopilote o un mono, pero casi siempre vivían en paz. Creo que la madre abandonó el primer nido y el pichón se murió debido a hormigas u otros invertebrados que infestaban el nido, que nunca fue aseado. Mientras estaba muriendo, el padre traía culebras a la palma pero no las entregaba en ausencia de la madre. En el segundo año, los Guacos anidaron dos veces sin éxito.

Localización: Biblioteca del BIODOC: 598.291.728 C749r.